

HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H&L) (HRP 羊抗兔二抗)

产品货号

H6162S, H6162

产品规格

20 µL, 100 µL

储存条件

-20°C保存，有效期见外包装。

应用范围

WB, IHC

使用方法

HRP Goat Anti-Rabbit IgG(H&L)用于 DAB 显色推荐稀释比例为 1:500-1:1000，用于 WB 推荐稀释比例为 1:5000-1:25000，用于 IHC 推荐稀释比例为 1:20-1:1000，实验应根据抗原以及抗体的具体情况进行调整（推荐比例使用次数请见表 1）。

表 1 按照 100 µL/次，使用次数

应用	20 µL	100 µL
DAB显色	100-200次	500-1000次
WB	1000-5000次	5000-25000次
IHC	4-200次	20-1000次

注意事项

- 使用前请将产品瞬时离心至管底，再进行后续实验。
- 抗体缓冲液，最好不含甘油、叠氮钠、氨基物质（甘氨酸、Tris 等）。少量氨基物质（<0.05M）和少量叠氮钠（<0.2%），对实验不会产生严重影响。
- 为避免反复冻融，可对本产品进行小量分装。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。