

## HRP Goat Anti-Mouse IgG (H&L) (HRP 羊抗鼠二抗)

### 产品货号

H6161S, H6161

### 产品规格

20 µL, 100 µL

### 储存条件

-20°C保存，有效期见外包装。

### 应用范围

WB, IHC

### 使用方法

HRP Goat Anti-Mouse IgG (H&L) 用于 DAB 显色推荐稀释比例为 1:500-1:1000, 用于 WB 推荐稀释比例为 1:5000-1:25000, 用于 IHC 推荐稀释比例为 1:20-1:1000, 实验应根据抗原以及抗体的具体情况进行调整 (推荐比例使用次数请见表 1)。

表 1. 按照 100 µL/次，使用次数

| 应用     | 20 µL       | 100 µL       |
|--------|-------------|--------------|
| DAB 显色 | 100-200 次   | 500-1000 次   |
| WB     | 1000-5000 次 | 5000-25000 次 |
| IHC    | 4-200 次     | 20-1000 次    |

### 注意事项

- 使用前请将产品瞬时离心至管底，再进行后续实验。
- 抗体缓冲液，最好不含甘油、叠氮钠、氨基物质（甘氨酸、Tris 等）。少量氨基物质（<0.05M）和少量叠氮钠（<0.2%），对实验不会产生严重影响。
- 为避免反复冻融，可对本产品进行小量分装。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。